



teva Portafolio Cardiometabólico


VASCULFLOW®

DOBESILATO DE CALCIO, DIOSMINA, HESPERIDINA

Tableta

250 mg - 225 mg - 25 mg

Caja con 30 tabletas



250 mg /
225 mg /
25 mg




teva

LA TRIPLE ACCIÓN

para el bienestar venoso

INFORMACIÓN PARA
PRESCRIBIR AMPLIA



LA TRIPLE ACCIÓN

para el bienestar venoso



I. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: **VASCULFLOW®**

II. DENOMINACIÓN GENÉRICA: Dobesilato de Calcio, Diosmina, Hesperidina

III. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

TABLETA

Cada tableta contiene:

Dobesilato de Calcio	250 mg
Diosmina	225 mg
Hesperidina	25 mg
Excipiente cbp	1 tableta

IV. INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Insuficiencia venosa: Várices, síndrome varicoso e insuficiencia venosa, flebalgias, pesantez de piernas, edemas estáticos de piernas, secuelas postflebiticas, estados preulcerosos. Tratamiento de los signos funcionales de las hemorroides y de las crisis hemorroidales agudas.

Riesgo vascular: del arterioescleroso, del diabético, del hipertenso, del paciente senil, accidentes vasculares oftalmológicos, hemorragias subconjuntivales y retinianas.

V. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA Diosmina/Hesperidina

VASCULFLOW® aumenta el tono venoso porque prolonga la actividad de la noradrenalina sobre la pared venosa. **VASCULFLOW®** no sólo activa el retorno venoso, sino también estimula y mejora el drenaje linfático. Mejora la microcirculación, demostrado en estudios hechos en animales.

Protege la pared venosa contra los mediadores bioquímicos implicados en la reacción inflamatoria y ejerce un efecto inhibidor sobre la síntesis de las prostaglandinas PGE2, PGF2a y tromboxano B2. Asimismo, actúa sobre las formas reactivas del oxígeno producidas por los polimorfonucleados e inhibe la reacción de degradación del AMP cíclico por la fosfodieserasa.

VASCULFLOW® aumenta el tono venoso, porque actúa en forma directa y potente sobre la túnica muscular de la pared venosa, mejorando con ello el débito venoso, disminuyendo la distensión y la estasis venosa.

La absorción por vía digestiva es rápida; la máxima concentración plasmática y tisular se logra al cabo de 1-2 horas después de la administración.

Las vías de eliminación son la urinaria y la digestiva a través de las heces.

El 90% de la dosis administrada se elimina después del 2o. día.

Dobesilato de calcio

Actúa a nivel de las paredes capilares, regularizando las funciones fisiológicas perturbadas como son: la permeabilidad aumentada y la resistencia disminuida. El dobesilato de calcio, administrado por vía oral, es absorbido en el tracto gastrointestinal.

Tras su administración se observa la máxima tasa sanguínea aproximadamente a las 6 horas. En la tercera y decima hora se observa una meseta prolongada, 24 horas después de la administración, la vida media plasmática es en promedio de 5 horas.

La tasa de enlace con proteínas plasmáticas es del 20 al 25%. El dobesilato de calcio no atraviesa la barrera hematoencefálica ni la barrera placentaria.

Aproximadamente 50% de la dosis administrada por vía oral se elimina por la orina en las primeras 24 horas. Esta misma tasa de eliminación se observa a nivel de las heces. El 92% del dobesilato de calcio es excretado en forma inalterada y el resto como metabolitos.

VI. CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a Dobesilato de Calcio, Diosmina y Hesperidina.

VII. PRECAUCIONES GENERALES

En caso de insuficiencia renal severa que requiera diálisis se debe reducir la dosis. En muy raros casos (0.32/ millón de pacientes), incidencia estimada con base en reportes espontáneos, la ingestión de dobesilato de calcio puede inducir agranulocitosis, probablemente asociada con una reacción de hipersensibilidad.

Esta condición puede ser expresada por síntomas como fiebre elevada, infecciones de la cavidad oral (tonsilitis), dolor de garganta, inflamación anogenital y síntomas asociados, que con frecuencia son signos de una infección. Se debe indicar al paciente que informe de inmediato, a su médico cualquier signo de infección.

En tal caso, es esencial controlar sin demora la formula hemática y leucograma y suspender el tratamiento.

VIII. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No hay estudios disponibles en mujeres embarazadas ni en animales. Puesto que no se sabe, si el dobesilato de calcio atraviesa la barrera placentaria en el humano, el fármaco sólo se debe administrar si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto. El dobesilato de calcio pasa a la leche materna en cantidades muy bajas (0.4 mg/ml después de ingerir 1500 mg).

Como precaución, se debe suspender el tratamiento o bien la lactancia.

IX. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Aun cuando la tolerabilidad de **VASCULFLOW®** es buena ocasionalmente se han reportado náuseas y molestias gastrointestinales (menos del 2%) en personas sensibles.

Estos efectos desaparecen al descontinuar el tratamiento.

En raras ocasiones se han reportado reacciones cutáneas y fiebre.

En caso de alteraciones gastrointestinales, la dosis de debe reducir o suspender temporalmente el tratamiento.

En caso de reacciones cutáneas y fiebre, se debe suspender el tratamiento e informar al médico a cargo, ya que esto puede constituir una reacción alérgica.

X. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

No debe administrarse simultáneamente con antiácidos o alimentos altamente alcalinos ya que puede disminuir su absorción.

Exceptuando los antiácidos **VASCULFLOW®** puede administrarse concomitantemente con cualquier otra medicación.

VASCULFLOW® No tiene efectos sobre la capacidad para conducir y operar maquinaria.

XI. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO

VASCULFLOW® no modifica los resultados de exámenes de laboratorio, excepto algunos casos en los cuales ha disminuido las cifras de ácido úrico elevadas lo cual se atribuye a una acción uricosúrica de la diosmina; esto redundar en un beneficio para el paciente.

XII. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENÉSIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD

VASCULFLOW® carece de acción carcinogénica, mutagénica y teratogénica a corto mediano y largo plazo. Los estudios han evidenciado la buena tolerabilidad en ratas no se produjeron anomalías histológicas o anatómicas habiéndoles administrado 180 veces la dosis para el humano ni en primates con dosis 35 veces superiores a las del humano durante 26 semanas.

XIII. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía de administración: Oral.

Dosis: Una tableta cada 12 ó 24 horas con los alimentos.

XIV. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

Hasta la fecha no existen reportes de accidentes por sobredosificación con **VASCULFLOW®**.

En el remoto caso de que esto sucediera deberá recomendarse provocar el vómito y realizar lavado gástrico, además de vigilar el estado general del paciente.



LA TRIPLE ACCIÓN

para el bienestar venoso



XV. PRESENTACIÓN O PRESENTACIONES

Caja con 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50 y 60 tabletas con Dobesilato de Calcio 250 mg-Diosmina 225 mg-Hesperidina 25 mg.

XVI. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO

Consérvese a no más de 25°C.

XVII. LEYENDAS DE PROTECCIÓN

No se use durante el embarazo y la lactancia.
Su venta requiere receta médica.
No se administre en menores de 12 años de edad.
No se deje al alcance de los niños.
Literatura exclusiva para médicos.
Reporte las sospechas de reacciones adversas a los correos: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y safety.mexico@tevamexico.com.

XVIII. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO

REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V.
Carretera a Nogales No. 850, La Venta del Astillero, C.P. 45220
Zapopan, Jalisco, México.

XIX. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA

Registro No. 059M2008 SSA IV



MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD.

No. VEEVA: VSF-MX-00171 | Vasculflow® Reg. No. 059M2008 SSA IV | No. Aviso: 2614102002C00015
Reporte cualquier sospecha de reacción adversa con el uso de este medicamento al correo
safety.mexico@tevamexico.com y/o al teléfono 800 000 TEVA (8382)

